

Leefregels na plaatsing cochleair implantaat (CI)

Bij uw kind is een cochleair implantaat (CI) geplaatst. Voor een goed herstel is een aantal leefregels belangrijk voor als uw kind weer thuis is. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rij gezet.

Nabloeding, koorts en hoofdpijn

Blijft u thuis ook alert op een nabloeding, zeker de eerste 24 uur na de ingreep. Wees ook alert op koorts en hoofdpijn.

Medicatie

Uw kind voelt zich waarschijnlijk niet echt lekker, geef uw kind de eerste 48 uur op gezette tijden pijnmedicatie volgens voorschrift van de arts. Om de kans op een ontsteking van de wond of het implantaat zo klein mogelijk te houden, krijgt uw kind tijdens de operatie en de week erna antibiotica.

Wond

De wond mag tot de eerste poliklinische controleafspraak niet nat worden. Oplosbare hechtingen hoeven niet verwijderd te worden.

Bewegen en naar school

- Uw kind moet de eerste week rustig aan doen, dus bijvoorbeeld niet trampolinespringen en dergelijke.
- Uw kind mag 2 weken niet sporten.
- Uw kind mag 2 weken niet zwemmen in verband met de infectiegevoeligheid van het oorgebied na een operatie.
- Uw kind mag gewoon naar school als hij/zij zich goed voelt.

Contact

- Polikliniek keel-, neus-, en oorheelkunde: (010) 703 60 73 (bij spoedeisende problemen na ontslag, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 - 16:00 uur).
- Buiten deze tijden kunt u contact opnemen met de kliniek kinderchirurgie 1 Noord: (010) 703 67 05.