

Verzamelen van speeksel voor hormoonbepalingen voor de monitoring van AGS

Informatie voor ouders

Uw zoon of dochter is onder behandeling vanwege het adrenogenitaal syndroom (AGS). Een belangrijk onderdeel van AGS is behandeling met hydrocortison. We vragen u om thuis 2 keer speeksel af te nemen bij uw kind. Hiermee meten we of uw zoon of dochter de juiste hoeveelheid hydrocortison krijgt. Hieronder leest u hoe u speeksel kunt afnemen en opsturen naar het laboratorium.

Over de meting

Speeksel verzamelen

Wanneer moet u het speeksel afnemen?

- Het 1e buisje speeksel verzamelt u in de ochtend vlak na het wakker worden, vóór de 1e gift hydrocortison.
- Het 2e buisje speeksel verzamelt u 2 uur na de inname van de 1e gift hydrocortison.

Let op: uw kind mag 30 minuten voor de afname niet eten of tandenpoetsen.

Hoe moet u het speeksel afnemen?

Voer de volgende stappen uit om het speeksel af te nemen:

1. Spoel de mond eerst een keer goed met water.
2. Spuug net zolang in het buisje tot er speeksel inzit tot het streepje (minimaal 1 ml).
3. Doe de dop weer op het buisje.
4. Schrijf direct op de stickers van de buisjes de datum en het tijdstip van de afname (in uren en minuten).
5. Bewaar de buisjes in de koelkast totdat u ze opstuurt per post.

Speeksel opsturen

Heeft u in beide buisjes speeksel verzameld? Stop ze dan in de envelop en sluit de envelop goed af.

Heeft u het speeksel afgenomen op een **maandag, dinsdag, woensdag of donderdag**? Stuur de envelop dan nog dezelfde dag op: doe de envelop voor 17.00 uur in de oranje straatbrievenbus of geef het af bij een PostNL-locatie voor 18.00 uur.

Heeft u het speeksel afgenomen op een **vrijdag, zaterdag of zondag**? Stuur de envelop dan op maandag op. Bewaar de buisjes in de tussentijd in de koelkast.

Heeft u nog vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met de polikliniek kinderendocrinologie: (010) 703 66 43 (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur, keuze 3)

